

# Geprikkeld door prikkels



## Aanleiding

In Revalidatiecentrum Magentazorg ervaren revalidanten neurologie veel onrust op de afdelingen



**Opdracht:** Waardoor wordt deze onrust veroorzaakt en hoe kan deze worden verminderd?

## Probleem

Revalidanten zijn overprikkeld en ervaren klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en onrustig gedrag, dit belemmert hun revalidatie. Het probleem is opgelost als de revalidant:

- minder onrust toont;
- zich veilig voelt;
- geen klachten aangeeft.

## Analyse

Op de afdeling zijn er vooral veel prikkels door geluiden (karretjes, schoenen, praten, telefoons ed.) en deels door visuele prikkels, spullen die op de gang staan en fel licht.

## Doel

Iedere medewerker is zich bewust van zijn of haar gedrag en van de prikkels die dit kan oproepen bij het kwetsbare brein van de revalidanten. Ook bezoekers en andere aanwezigen op de afdeling worden meegenomen in wat gewenst gedrag is.

## Resultaat

Ontwikkelde middelen:

- ♥ Een pictogram die aangeeft dat er sprake is van overprikkeling. Deze kan op de kamerdeur van de betreffende revalidant worden geplaatst.
- ♥ Een poster over gewenst gedrag in het revalidatiecentrum.
- ♥ Een informatieve folder over overprikkeling.

